

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

疲れ目・かすみ目に 漢方製剤 ベルアベトン[®]K

特 徴

「目が疲れる」「目がかすむ」といった目の症状は、年齢による身体的機能の衰えとともに多くなってきます。

- 「ベルアベトンK」は、漢方の古典といわれる中国の医書「^{イキョウ}医級」に収載されている「^{コキョクジョウガン}杞菊地黄丸」という薬方からなる中国のお薬で、疲れ目、かすみ目に効果があります。
- 目が疲れる・目がかすむといった、目の症状に効果があります。
- 八つの生薬の総合的な働きにより、のぼせ・めまい・頭重などの症状に効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- * 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症：
かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

用法・用量

次の量を1日3回水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	8丸	3回
15才未満	服用しないこと	

成 分

成人1日の服用量24丸（6.0g）中、次の成分を含んでいます。

〔 クコシ・キクカ各0.288g、ジオウ1.152g、サンシュユ・サンヤク
各0.576g、ブクリョウ・ボタンピ・タクシャ各0.432g 〕

添加物として、ハチミツ、滑石を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸剤の色が多少異なることや、丸剤がくっつくことがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に丸剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **ハッ目製薬株式会社**
東京都江戸川区船堀2-14-14（〒134-0091）