

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように
大切に保管してください。

360錠
(18錠×20日分)

押し開ける

第2類
医薬品

販売名: 苓桂朮甘湯エキス錠クラシエ

〈成分〉成人1日の服用量18錠(1錠200mg)中
苓桂朮甘湯エキス(1/2量)……600mg
(カンゾウ1.0g、ケイヒ2.0g、ビャクジュツ
1.5g、ブクリョウ3.0gより抽出)
添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、
CMC-Ca、セルロース、ステアリン酸Mg、メタ
ケイ酸アルミン酸Mgを含有する。
(成分に関連する注意)本剤は天然物(生薬)のエキスを用
いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

〈効能〉体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、
ときにのぼせや動悸があるもの次の諸症:
立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、
神経症、神経過敏

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は
白湯にて服用。
成人(15才以上)……1回6錠
15才未満7才以上……1回4錠
7才未満5才以上……1回3錠
5才未満は服用しないこと
(用法・用量に関連する注意)小児に服用させる場合に
は、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。

製造
番号

使用
期限

発売元
クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20(F106-8090)
ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元
クラシエ株式会社
東京都港区海岸3-20-20(F106-8090)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
の問合せ先
☎0120-149-931
05040

△ 使用上の注意

☞ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、か
ゆみ等を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
むくみ
(6)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルド ステロン 症、ミオ パチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱ り感やこわばりに加えて、脱力 感、筋肉痛があらわれ、徐々に 強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない
場合は服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください

錠剤
いつでもそばに

20日分

漢方セラピー



苓桂朮甘湯

クラシエの漢方

T-7

リョウケイ
ジュンカクアントウ

360錠

めまい、
立ちくらみに

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、
ときにのぼせや動悸がある方

第2類医薬品



このお薬の詳しい説明を
動画でチェック!

- 〈保管及び取扱い上の注意〉
- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい
所に密栓して保管してください。
 - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用
の原因になったり品質が変わります。)
 - (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損する
のを防ぐためのものです。開栓後は不要とな
りますので捨ててください。
 - (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
 - (6)水分が錠剤につきまると、変色または色むら
を生じることがありますので、誤って水滴を落
としたり、ぬれた手で触れないでください。

360錠



ピン入りの錠剤です。