

防已黄耆湯

ぼういおうぎとう

お試しサイズ

5日分 60錠

Kracie

コッコアポ[®]L錠

余分な脂肪を分解・燃焼

体質に
あわせて
代謝を上げる

漢方製剤

あまり食べない方の たるみ脂肪に

たるんだおしり・
太ももなどに

肥満症・むくみ

第2類医薬品 60錠(5日分)

体力中等度以下で、
疲れやすく、汗のかきやすい
傾向がある方に

のみやすい
フィルムコート錠
原寸大



疲れやすく、筋肉にしまりのない
方の肥満に、脂質代謝を上げて
余分な脂肪を分解・燃焼して減ら
します。



切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名: コッコアポL錠 60錠

漢方製剤 第2類医薬品

チャック

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人 むくみ (6) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能] 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症: 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)

[用法・用量] 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人(15才以上) 1回4錠、15才未満5才以上 1回2錠、5才未満は服用しないこと

<用法・用量に関連する注意> 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

<成分> 成人1日の服用量12錠(1錠351mg)中

防已黄耆湯エキス.....3,200mg
(ポウイ・オウギ各5.0g、ビャクジュツ・タイソウ各3.0g、カンゾウ1.5g、ショウキョウ1.0gより抽出。)
添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素、CMC-Ca、クロスCMC-Na、水酸化Al/ Mg、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ヒプロメロースを含有する。

<成分に関連する注意> 本剤は天然物(生薬)のエキスを using していますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

[保管及び取扱い上の注意] (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりしめて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)
ホームページ www.kracie.co.jp

製造番号
PE、金属 使用期限

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造 **クラシエ 製薬株式会社**
発売元 東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

副作用救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

®登録商標 10036 H07