

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

1.0g×90包(30日分)

第3類医薬品

販売名：「クラシエ」ヨクイニンエキス顆粒

成分 成人1日の服用量3包(1包1.0g)中

ヨクイニンエキス…1,000mg

〔ヨクイニン20gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

(成分に関連する注意)

本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることや、ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります。

効能

いば、皮膚のあれ

用法・用量 1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人(15才以上)……………1回 1包 15才未満7才以上……………1回 2/3包

7才未満4才以上……………1回 1/2包 4才未満2才以上……………1回 1/3包

2才未満は服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

⚠ 使用上の注意**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **クラシエ 株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

副作用被害救済制度の問合せ先

☎0120-149-931

製造
番号使用
期限