

Kracie

45 錠

漢方セラピー 冷えやすい方の 急にくる下腹部の痛みに



芍薬甘草附子湯 T-72
シャク ヤク カン ソウ プ シ トウ

〈効能〉

体力中程度以下で、冷えを伴うものの次の諸症：こむらえり、筋肉のけいれん、胃痛、腹痛、腰痛、神経痛

〈用法・用量〉

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
15才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分〉

成人1日の服用量9錠(1錠270mg)中

芍薬甘草附子湯エキス(1/2量)・・・1,600mg

[シャクヤク・カンゾウ各3.0g、プシ末0.15gより抽出。]

添加物として、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、クロスCMC-Na、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、三二酸化鉄、カルナウバロウを含有する。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269(〒635-0103)

副作用被害救済制度の問合せ先☎0120-149-931

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

芍薬甘草附子湯エキス錠クラシエ

シャクヤクカンゾウプシトウ

チャック

漢方製剤

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- (4) 高齢者
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人 むくみ
- (7) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号/使用期限



PE, 金属

H01 1