

〈効能〉

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

〈用法・用量〉

成人(15才以上)1回1本、1日3回食前に服用してください。15才未満は服用しないでください。本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉定められた用法・用量を厳守してください。

〈成分〉

成人1日の服用量90mL(30mL×3本)中

柴胡桂枝湯抽出液A……60mL  
サイコ5.0g、ハンゲ4.0g、ケイヒ・シャクヤク各2.5g、オウゴン・ニンジン・タイソウ各2.0g、カンゾウ1.5g、ショウキョウ1.0gより抽出。

(柴胡桂枝湯抽出液A 1mLは、)原生薬約0.38gに相当する。

添加物として、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料、還元麦芽糖水アメ、L-グルタミン酸Na、L-アスパラギン酸Na、ハチミツ、シメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素を含有する。

# 腹痛、はきけのあるかぜに

さい こ けい し どう  
**柴胡桂枝湯**

クラシエの漢方

内服液



さいこ  
**柴胡**

30mL×3本

第2類医薬品



漢方製剤

押して開ける

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名：「クラシエ」柴胡桂枝湯液 30mL×3本

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

製造番号

使用期限

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、継続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3. 1ヵ月位(かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位)服用しても症状がよくなりないう場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 4. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱及びピラベルに記載)のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) ピンをあけたら飲みきってください。
- (6) ピンをあけたまま保存しないでください。

発売元  
クラシエ 薬品株式会社  
東京都港区海岸 3-20-20  
ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334  
受付時間 10:00~17:00(土、祝日を除く)

製造販売元  
大協薬品工業株式会社  
富山県富山市水橋島等173

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

18365